

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat pengetahuan pasien tentang obat generik di Apotek Perintis Tegal berada pada kategori cukup, dengan persentase 63% dari total 91 responden. Sebagian pasien sudah bisa memahami manfaat dasar obat generik, tetapi pengetahuan tentang mutu dan keamanan, efektivitas, serta indikasi atau penggunaan obat generik masih kurang memadai. Selain itu, berdasarkan karakteristik responden, kelompok usia 36-45 tahun, perempuan, serta yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK merupakan kelompok yang paling banyak berada pada kategori cukup. Tidak adanya responden dalam kategori kurang menunjukkan bahwa informasi tentang obat generik sudah cukup diterima oleh masyarakat, namun masih perlu peningkatan pemahaman yang lebih dalam.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Apotek Perintis Tegal

Apotek harus meningkatkan strategi edukasi obat generik dengan menggunakan konsultasi langsung saat penyerahan obat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Peran apoteker juga harus dioptimalkan agar penjelasan tentang mutu dan keamanan, efektivitas, serta indikasi atau

penggunaan obat generik dapat meningkatkan pengetahuan pasien dari kategori cukup menjadi kategori baik.

2. Bagi Pasien atau Masyarakat

Pasien diharapkan lebih aktif dalam menanyakan informasi terkait obat generik yang diterima, terutama mengenai mutu dan keamanan, efektivitas, serta indikasi atau penggunaan obat generik. Masyarakat juga disarankan untuk mencari sumber informasi kesehatan yang terpercaya seperti apoteker, fasilitas kesehatan, atau media edukasi yang resmi dari pemerintah agar pengetahuan mereka mengenai obat generik semakin luas dan tidak hanya bergantung pada persepsi umum.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti jenis pekerjaan, pendapatan, atau seberapa sering mengunjungi apotek untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang obat generik. Serta dapat memperluas dengan menilai hubungan antara pengetahuan dan perilaku tentang obat generik, atau menambahkan metodologi penelitian lain seperti wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.