

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pasien perempuan memiliki persentase lebih banyak, yaitu 69%, dibandingkan dengan pasien laki-laki, yaitu 31%. Kelompok usia menunjukkan bahwa penggunaan obat antihistamin oral paling banyak ditemukan pada pasien kelompok usia 1-10 tahun (30%).
2. Pola persepsian obat antihistamin meliputi nama obat yang digunakan CTM (58%), obat yang paling banyak diresepkan. Golongan obat antihistamin yang paling banyak diresepkan yaitu golongan AH₁ generasi I (58%), dan bentuk sediaan yang diresepkan pada pasien penyakit kulit adalah semipadat (89%).
- 2.. Evaluasi kerasionalitas penggunaan antihistamin oral pada pasien rawat jalan di Puskesmas Talang menunjukkan bahwa: tepat pemilihan obat (100%), tepat indikasi (100%), dan tepat dosis (100%)

5.2 Saran

1. Kepada mahasiswa atau peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti tentang kerasionalan persepsian obat selain antihistamin di puskesmas tersebut.
2. Perlu dilakukan penelitian rasionalitas penggunaan obat antihistamin dengan kriteria yang berbeda yaitu:

- a. Tepat lama pemberian
- b. Tepat interval waktu pemberian
- c. Waspada terhadap efek samping
- d. Tepat diagnosa
- e. Tepat pemberian obat yang efektif, aman mutu terjamin serta tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau